

開封後はチャックを閉めて保管してください。

チャック

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。

第3類医薬品 コンブルコンV

▲ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症状 |
|------|------------|
| 皮膚 | 発疹 |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、口内炎 |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢
 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミン B₁ の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

次の量を1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は、朝昼晩、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1錠	1日1~3回
15歳未満	服用しないこと	

使用期限

製造番号

【内容量】 90錠

【成分・分量】 1日最大量(3錠)中

成分	分量
チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	30mg

添加物：塩酸グルコサミン、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、シヨ糖脂脂肪酸エステル、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、タルク

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを開けて保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)
4. 湿気等の影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずチャックをしっかり閉めてください。
5. ぬれた手で触れないでください。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。
6. 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
7. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
8. 使用期限内であっても、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

お問い合わせ先

株式会社東京ディベロ

電話 0120-107-111

受付時間 9:00 ~ 18:00

(日曜・年末年始を除く)

発売元

株式会社東京ディベロ

東京都中央区日本橋本石町 4-2-16

製造販売元

シオノケミカル株式会社

東京都中央区八重洲 2 丁目 10 番 10 号



6887199-A