

ミノキシジルローション1%女性用jp チェックシート

●本剤のご購入は、薬剤師が承ります。

このチェックシートでセルフチェックをされた後、薬剤師までお持ちください。

【効能・効果】

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。

【用法・用量】

成人女性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

【成分・分量】 100mL 中

ミノキシジル 1.0g、パントテニールエチルエーテル 1.0g、

トコフェロール酢酸エステル 0.08g、l-メントール 0.3g

〔添加物〕

エタノール、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム（2）、pH調整剤

●ご使用に際しては、製品に同封している説明書や使用者向け情報提供資料をよくお読みになり、正しくお使いください。

ミノキシジルローション1%女性用jpをご購入のお客様へ

本剤はミノキシジルを有効成分とする発毛剤です。正しくお使いいただくために、次のことをお守りください。

- ご購入の前に、中面のチェックシートで壮年性脱毛症のセルフチェックを行ってください。
- 次の方は本剤のご購入前に必ず医師又は薬剤師に相談してください。

- 高血圧・低血圧で現在治療中の方
- 狭心症等、心臓に障害のある方
- 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の方

●次の場合は本剤を使用しないでください。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 20歳未満の人。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。
- 妊娠、出産に伴い脱毛している人。
- 避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。
- 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等）の人。
- 原因のわからない脱毛症の人。
- 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。
- 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
- 頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。
- 男性。
- 頭皮にきず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある場合。

●使用後、以下のような症状がみられた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

- 頭皮に発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等の症状があらわれた場合。
*頭皮以外にあらわれることもあります。
- 頭痛が起きた場合。
- 胸の痛みがでたり、心拍が速くなったり、気が遠くなったり、めまいが起きた場合。
- 原因のわからない急激な体重増加がみられた場合。
- 手足がむくんだ場合。
- 脱毛状態の悪化や、頭頂部だけでなく側頭部や後頭部等の頭部全体の脱毛、頭髮以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等がみられた場合。

●商品をご購入する上で分からない点がありましたら、必ず薬剤師に相談してください。

製造販売元
シオノケミカル株式会社
東京都中央区八重洲2丁目10番10号

ミノキシジルローション1%女性用jp チェックシート

以下の項目にあてはまる方は□にチェックを記入してください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある。	Yes ↓ No	☐ ①使用しないでください。
20歳未満である。	Yes ↓ No	☐ ②使用しないでください。 (国内での使用経験がありません。)
妊婦又は妊娠していると思われる、又は授乳中である。	Yes ↓ No	☐ ③使用しないでください。 (妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。 また、ミノキシジルは母乳中に移行します。)
妊娠、出産に伴い脱毛している。	Yes ↓ No	☐ ④使用しないでください。 (壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。)
避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している。	Yes ↓ No	
頭髮が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部位が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。	Yes ↓ No	
頭髮以外の体毛（まゆ毛等）が脱毛している。	Yes ↓ No	
急激なダイエットにより脱毛してきた。	Yes ↓ No	
頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している。	Yes ↓ No	
急激に脱毛している。	Yes ↓ No	
髪を頭皮から強く引っ張るような髪型により脱毛している。	Yes ↓ No	

右の項目に続く

- ご購入の前に、ご自身が「ミノキシジルローション1%女性用jp」の使用に適しているか、「チェックシート」で確認してください。
- 「ミノキシジルローション1%女性用jp」をご購入の際は、このシートを薬剤師へお渡しになり、「チェックシート」の確認及び説明をうけてください。
- ご使用に際しては、製品に同封している説明書や使用者向け情報提供資料をよくお読みになり、正しくお使いください。

男性である。	Yes ↓ No	☐ ⑤使用しないでください。 (本剤は女性用です。)
頭皮にきず、湿疹あるいは炎症（発赤）がある。	Yes ↓ No	☐ ⑥きず、湿疹あるいは炎症（発赤）を治してから再確認してください。 (きず等を悪化させることがあります。)
下図よりも脱毛している。 	Yes ↓ No	☐ ⑦使用しないか、使用する前に医師又は薬剤師に相談してください。 (壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。)
家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。	Yes ↓ No	☐ ⑧使用を控えられをおすすめします。 使用する場合は、 必ず 医師又は薬剤師に相談してください。 (本剤は血压に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
高血圧・低血圧で現在治療を受けている。 狭心症等、心臓に障害がある。	Yes ↓ No	☐ ⑨使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある。 高血圧又は低血圧である。 心臓や腎臓に障害がある。 むくみがある。	Yes ↓ No	☐ ⑩使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (甲状腺疾患による脱毛の可能性あります。)
甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の診断を受けている。	Yes ↓ No	☐ ⑪一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなるため、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
65歳以上である。	Yes ↓ No	☐ ミノキシジルローション1%女性用jpを使用できます。 使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みになり、ご購入ください。