

----- ✂ ここからお切り下さい。 -----

開封後は必ずチャックを閉めて保管してください▼

第2類医薬品

＜強心薬＞

服用に際して、この説明文を
必ずお読みください。

リラ心錠

15錠

▲ 使用上の注意

❗ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の強心薬

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

動悸、息切れ、気付け

■ 用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1錠	1日1回
15歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

かまずに服用してください。

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

■ 成分・分量

1日量（1錠）中 センソ……2mg
添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、スクラロース、カルナバウロウ、三酸化鉄

■ 保管及び取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。）
- 湿気等の影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずチャックをしっかり閉めてください。
- ぬれた手で触れないでください。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

＜商品のお問い合わせ＞

株式会社 ECスタジオ
TEL 0570-088-067
受付時間 11：00～18：00
（土・日・祝日を除く）

■ 販売元

株式会社 ECスタジオ
東京都千代田区麹町 2-2-4

■ 製造販売元

シオノケマル株式会社
東京都中央区八重洲 2-10-10

使用期限

製造番号



77771104-A